

Besten,

Ik mail jullie in jullie rol als hoofd verloskunde, danwel hoofd prenatale diagnostiek. Graag jullie aandacht voor de PARVO epidemie die gaande is. Op dit moment hebben wij als foetaal therapeutisch centrum meerdere cases onder zorg (gehad) die parvo+ zijn en intrauteriene transfusie nodig hebben. De aantallen zijn meer dan we ooit meegemaakt hebben.

We merken in verwijstraject helaas toch in meerdere gevallen vertraging, danwel vergissingen (bv alleen IgG bepaald waardoor niet gedacht werd dat het parvo kon zijn). We hebben nu helaas een tweede casus in hele korte tijd die zo ontzettend hydropisch is, dat deze niet opknapt na IUT. Ook in deze casus al 4 weken klachten (incl minder leven). Voor zulke zieke Parvo foetussen komt de IUT te laat, terwijl het i.p. een goed behandelbare aandoening is.

Waarom deze mail? Wat vraag ik van jullie?

Maak je team alert, ook graag je affiliatie ziekenhuizen

Informeert je hele regio, je VSV, laten we proberen ook de eerste lijn te bereiken.

Informeert hen nog eens op de zaken die voor ons zo vanzelfsprekend is:

Vraag bij minder leven verkoudheden, gewrichtsklachten en 5e ziekte in omgeving, na

Meet bij minder leven laagdrempelig PSV-ACM, nu er zo'n epidemie gaande is

Denk bij hydrops aan PARVO

IgG bij PARVO is er heel snel, dus nooit bepalen zonder IgM

Bij serologische conversie maternaal: volg PSV-ACM op, wil je overleggen, wij zijn altijd bereid:

Vraag naar pieper 98866 in LUMC

Hoe zwangeren en 1e lijn te informeren, wordt over nagedacht door Liesbeth van Leeuwen als infectieziekten-perinatoloog, in samenspraak met NVOG.

Hartelijke groet

Monique

Monique C. Haak MD PhD

Professor of Obstetrics and Fetal Cardiology